

BİTKİ ADI	ETKİLİ OLDUĞU YABANCIOTLAR	KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ	ETKİ SÜRESİ
Kültür bitkisi yetiştirilmeyen (boş) alanlar	<p>Tilki Kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) İmam Pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>) Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Tarla Köpek Papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Yatık Boya Kökü (<i>Asperugo procumbens</i>) Yabani Yulaf (<i>Avena fatua</i>) Koyun Gözü Papatya (<i>Bellis perennis</i>) Kokarot (<i>Bifora radians</i>) Japon Bromu (<i>Bromus japonicus</i>) Püsküllü Çayır (<i>Bromus tectorum</i>) Çoban Çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Yabani Tere (<i>Cardaria draba</i>) Saka Dikeni (<i>Carduus pycnocephalus</i>) Topak Boynuz Otu (<i>Cerastium glomeratum</i>) Yabani Havuç (<i>Daucus carota</i>) Hazeran (<i>Delphinium consolida</i>) Güneş Sütleğeni (<i>Euphorbia helioscopia</i>) Şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) Yabani Marul (<i>Lactuca serriola</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Tavşan Salatası (<i>Lapsana communis</i>) Tavşan Bıyığı (<i>Poa annua</i>) Adi Salkım Otu (<i>Poa trivialis</i>) Düğün Çiçeği (<i>Ranunculus repens</i>) Yabani Turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yatık İmam Kavuşu (<i>Senecio vulgaris</i>) Kuş Otu (<i>Stellaria media</i>) Adi Yavşan Otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Kaba Tüylü Fiğ (<i>Vicia hirsuta</i>) Adi Fiğ (<i>Vicia sativa</i>) Doğu Ballıbaba (<i>Wiedemannia orientalis</i>)</p>	<p>450 ml /da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde</p>	4 ay
	<p>Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Dönbaba (<i>Erodium cicutarium</i>) Köpek Dişi Ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kırmızı Çiçekli Ballıbaba (<i>Lamium purpureum</i>) İtalyan Çimi (<i>Lolium multiflorum</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Kamış (<i>Phragmites australis</i>) Ortanca Sinir Otu (<i>Plantago media</i>) Kıvırcık Labada (<i>Rumex crispus</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Eşek Marulu (<i>Sonchus arvensis</i>) Isırgan Otu (<i>Urtica urens</i>)</p>	<p>700 ml / da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde</p>	